

វ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺ រលាកថ្លើម ប្រភេទបេ (Hepatitis B)

១- តើជំងឺរលាកថ្លើមប្រភេទបេជាអ្វី?

ជំងឺរលាកថ្លើមប្រភេទបេ គឺជាជំងឺថ្លើមធ្ងន់ធ្ងរមួយ បង្កដោយមេរោគរលាកថ្លើម ប្រភេទបេ។ ជំងឺរលាកថ្លើម ប្រភេទបេ អាចបណ្តាលអោយ៖

- រលាកថ្លើមស្រួចស្រាវ

ករណីបែបនេះ អ្នកជំងឺអាចមានសញ្ញា៖

- រាគ និង ក្អួត
- មិនឃ្លានអាហារ
- ហោរហាត់
- ស្បែកឡើងល្បឿង
- ឈឺតាមសាច់ដុំ សន្លាក់ឆ្អឹង និង ឈឺក្នុងពោះ

- រលាកថ្លើមរ៉ាំរ៉ៃ

ក្រោយមានការបង្ករោគ ដោយមេរោគរលាកថ្លើម ប្រភេទបេ អ្នកជំងឺមួយចំនួនបានវិវត្តទៅជាអ្នកជំងឺរលាកថ្លើមរ៉ាំរ៉ៃ។ ក្នុងទំរង់រលាកថ្លើមរ៉ាំរ៉ៃនេះភាគច្រើន អ្នកជំងឺពុំមានចេញជាជំងឺសញ្ញាអ្វីឡើយ ប៉ុន្តែការបង្ករោគនេះនៅតែអាចវិវត្តន៍យ៉ាងខ្លាំងក្លា ដែលអាចបណ្តាលអោយមានផលវិបាកធ្ងន់ធ្ងរ ដូចជា៖ ក្រិនថ្លើម មហារីកថ្លើម និងស្លាប់បាត់បង់ជីវិត។

គេសង្កេតឃើញថា ការវិវត្តទៅជាទំរង់រលាកថ្លើម ប្រភេទបេ រ៉ាំរ៉ៃ ភាគច្រើន កើតមានលើកុមារតូចៗ ច្រើនជាងមនុស្សពេញវ័យ។ អ្នកជំងឺរលាកថ្លើមរ៉ាំរ៉ៃអាចចំលងមេរោគទៅអ្នកដទៃទៀតបាន បើទោះបីជាអ្នកជំងឺមិនមានរោគសញ្ញាអ្វីក៏ដោយ។

មនុស្សអាចឆ្លងមេរោគថ្លើម ប្រភេទបេ នេះតាមរយៈ៖

- ឈាម រឺ សារធាតុរាវនៃអ្នកជំងឺបានចម្រុះដោយផ្ទាល់មកលើស្បែកដែលមានរបួស
 - មុតមូល រឺ វត្ថុមុតស្រួចដែលមានជាប់មេរោគ
 - រួមភេទជាមួយអ្នកផ្ទុកមេរោគដោយមិនការពារ
 - ប្រើប្រាស់មូលរួមគ្នា (ចាក់គ្រឿងញៀន)
 - ប្រើប្រាស់សំភារៈដែលប្រលាក់ដោយឈាម រឺ សារធាតុរាវនៃអ្នកជំងឺ (កាំបិតកោរ ប្រាសដុសធ្មេញ) (មេរោគនេះអាចរស់នៅបាន ៧ ថ្ងៃ ក្នុងបរិយាកាស)។
- ម្តាយដែលមានជំងឺរលាកថ្លើម ប្រភេទបេ អាចចំលងទៅទារកនៅពេលសំពៅ។

២- វ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺរលាកថ្លើម ប្រភេទបេ

វ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺរលាកថ្លើម ប្រភេទបេ អាចការពារការឆ្លងរាលដាលនៃជំងឺនេះ និងការពារផលវិបាកធ្ងន់ធ្ងរដូចជា ក្រិនថ្លើម និងមហារីកថ្លើមជាដើម។ វ៉ាក់សាំងនេះត្រូវបានណែនាំអោយចាក់ចំនួន ៣ ដូស៖

- ដូសទី១: ក្រោយពេលពិនិត្យឈាម បញ្ជាក់ថាគ្មានផ្ទុកមេរោគនេះ ហើយពុំទាន់មានប្រព័ន្ធការពារ
- ដូសទី២: ១ ទៅ ២ ខែ បន្ទាប់ពីដូស ទី១
- ដូសទី៣: ៦ ទៅ ១៨ ខែ បន្ទាប់ពីដូស ទី២

ចំពោះកុមារតូចៗ ក្នុងករណី ដែលភាពប្រឈម នឹងការឆ្លង មានអាត្រាខ្ពស់ គេអាចនឹងផ្តល់ដូសទី៤បន្ថែម ដោយពុំមានផលប៉ះពាល់អ្វីឡើយ។

៣- តើអ្នកណាខ្លះ ដែលមិនគួរទទួលវ៉ាក់សាំងនេះ?

- អ្នកដែលធ្លាប់មានប្រវត្តិប្រតិកម្មធ្ងន់ធ្ងរជាមួយវ៉ាក់សាំងប្រភេទនេះពីមុន ឬ ធ្លាប់ប្រតិកម្មធ្ងន់ធ្ងរជាមួយសមាសធាតុផ្សំផ្សេងទៀតដែលមាននៅក្នុងវ៉ាក់សាំង
- ចំពោះអ្នកមានជំងឺកំរិតមធ្យម រឺ ធ្ងន់ធ្ងរ ការផ្តល់វ៉ាក់សាំងនេះគួរត្រូវបានពិនិត្យរហូតដល់ពេលជាសះស្បើយពីជំងឺជាមុនសិន។

៤- ផលវិបាកដែលអាចកើតមានក្រោយពេលចាក់វ៉ាក់សាំងនេះ

ក៏ដូចជាឱសថផ្សេងៗទៀតដែរ វ៉ាក់សាំងអាចបណ្តាលអោយមានផលវិបាកធ្ងន់ធ្ងរដូចជា ប្រតិកម្ម អាឡែហ្ស៊ីជាដើម។ ប៉ុន្តែលទ្ធភាពដែលវ៉ាក់សាំងនេះអាចបណ្តាលអោយមានផលវិបាកធ្ងន់ធ្ងរមានតិចតួចបំផុត។ ផលវិបាកដែលអាចកើតឡើងរួមមាន៖

- ឈឺ ឬ ហើមគ្រងកន្លែងចាក់
- គ្រុនក្តៅ ឈឺក្បាល
- ឡើងកន្ទួលក្រហមលើស្បែក
- ប្រតិកម្មធ្ងន់ធ្ងរ (កម្រមានណាស់)

ប្រសិនបើមានសញ្ញាប្រតិកម្មធ្ងន់ធ្ងរ សូមជូនដំណឹងដល់គ្រូពេទ្យជាបន្ទាន់!