

## វ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺ កញ្ជ្រីល-ស្លូច-ស្រឡូវទែន (MMR Vaccine)

### ១- ហេតុអ្វីអ្នកត្រូវទទួលវ៉ាក់សាំងប្រភេទនេះ?

ជំងឺកញ្ជ្រីល-ស្លូច-ស្រឡូវទែន ជាជំងឺដ៏ធ្ងន់ធ្ងរដែលគេជួបប្រទះជាញឹកញាប់ ជាពិសេសលើកុមារតូចៗ។

#### • កញ្ជ្រីល

- \* វីរុសកញ្ជ្រីលបង្កអោយមានជាសញ្ញាកន្ទួលក្រហមលើស្បែក ក្អក ហៀរសំបោរ រមាស់ភ្នែក និងគ្រុនក្តៅ។
- \* វាអាចបណ្តាលអោយមានផលវិបាកធ្ងន់ធ្ងរដូចជា ការបង្ករោគក្នុងត្រចៀក រលាកសួត ប្រកាច់ ការប៉ះពាល់ខួរក្បាល និងអាចបណ្តាលអោយស្លាប់បាត់បង់ជីវិតទៀតផង។

#### • ស្លូច

- \* វីរុសស្លូចអាចបង្កអោយមានជាសញ្ញាកន្ទួលក្រហមលើស្បែក រលាកសន្លាក់ និងគ្រុនក្តៅ។
- \* ប្រសិនបើជំងឺស្លូចនេះកើតមានចំពោះស្ត្រីមានផ្ទៃពោះ វាអាចបណ្តាលអោយមានផលវិបាកយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរដូចជា រលូតកូន រឺកូនកើតមកអាចមានភាពមិនប្រក្រតីពីកំណើតធ្ងន់ធ្ងរ។

#### • ស្រឡូវទែន

- \* វីរុសស្រឡូវទែនបង្កអោយមានជាសញ្ញាគ្រុនក្តៅ ឈឺក្បាល ឈឺសាច់ដុំ លែងឃ្នានអាហារ និងហើមក្រពេញទឹកមាត់។
- \* វាអាចបណ្តាលអោយមានផលវិបាកធ្ងន់ធ្ងរដូចជា ផ្លូវ រលាកស្រោមខួរ ការហើម និងមានការឈឺចាប់យ៉ាងខ្លាំងនៅនឹងពងស្វាស ឬអ្វីដ៏ដោយក៏ វាអាចបណ្តាលអោយអា មិនអាចមានកូនបាន។

### ២- តើអ្នកណាខ្លះត្រូវទទួលវ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺនេះ? ហើយត្រូវធ្វើនៅពេលណា?

កុមារ ត្រូវទទួលវ៉ាក់សាំងនេះ ចំនួន២ដង៖

- ដូសទី១: នៅពេលដែលកុមារមានអាយុ៨ខែ
- ដូសទី២: នៅពេលដែលកុមារមានអាយុ៤-៦ឆ្នាំ

មនុស្សពេញវ័យ ដែលពុំធ្លាប់ទទួលវ៉ាក់សាំងនេះ ហើយពុំទាន់ដែលកើតជំងឺទាំងនេះ ត្រូវចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការនេះចំនួន២ដូស៖

- ដូសទី១: ត្រូវផ្តល់ឲ្យភ្លាមៗ
- ដូសទី២: នៅ ២៨ថ្ងៃ យ៉ាងតិច ក្រោយពីដូសទី១

### ៣- តើមនុស្សណាខ្លះដែលមិនត្រូវចាក់វ៉ាក់សាំងនេះ?

- អ្នកដែលធ្លាប់មានប្រវត្តិប្រតិកម្មធ្ងន់ធ្ងរជាមួយនឹងវ៉ាក់សាំងប្រភេទនេះពីមុន ឬធ្លាប់ប្រតិកម្មធ្ងន់ធ្ងរជាមួយសមាសធាតុផ្សំផ្សេងទៀតដែលមាន ក្នុងវ៉ាក់សាំងនេះ
- អ្នកដែលមានប្រវត្តិប្រតិកម្មជាមួយថ្នាំ NEOMYSINE
- ស្ត្រីដែលកំពុងមានផ្ទៃពោះ
  - \* ត្រូវចៀសវាងកុំអោយមានផ្ទៃពោះ រយៈពេល៤សប្តាហ៍ បន្ទាប់ពីចាក់វ៉ាក់សាំងនេះរួច
- អ្នកដែលមានប្រព័ន្ធភាពសុំចុះខ្សោយ
- អ្នកដែលកំពុងមានជំងឺ
- អ្នកដែលមានចំនួនផ្លាកកែតចុះទាប
- អ្នកដែលធ្លាប់បានចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការជាទំរង់រស់ ក្នុងកំឡុងពេល ៤សប្តាហ៍ កន្លងមក
- អ្នកដែលបានបញ្ចូលឈាម ក្នុងពេលថ្មីៗនេះ

### ៤- ផលវិបាកដែលអាចកើតមានក្រោយចាក់វ៉ាក់សាំង

ដូចឱសថផ្សេងៗទៀតដែរ វ៉ាក់សាំងអាចបណ្តាលអោយមានផលវិបាកធ្ងន់ធ្ងរ ដូចជាប្រតិកម្មអាលែកស៊ីជាដើម។ ប៉ុន្តែលទ្ធភាពដែលវ៉ាក់សាំងបង្ការនេះអាច បណ្តាលអោយមានផលវិបាកធ្ងន់ធ្ងរ មានតិចតួចបំផុត។ ផលវិបាកដែលអាចកើតឡើងរួមមាន៖

- ឈឺ ឬ ហើមត្រង់កន្លែងចាក់
- គ្រុនក្តៅ ឡើងកន្ទួលក្រហមលើស្បែក
- ហើមកូនកណ្តុរនៅផ្តាល់ ឬ នៅត្រង់ក
- ប្រតិកម្មធ្ងន់ធ្ងរ (កំរមានណាស់)

**ប្រសិនបើមានសញ្ញាប្រតិកម្មធ្ងន់ធ្ងរ សូមជូនដំណឹងដល់គ្រូពេទ្យជាបន្ទាន់!**