

វ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺឆ្កែឆ្លុត (Rabies Vaccine)

១- ជំងឺឆ្កែឆ្លុតជាអ្វី?

ជំងឺឆ្កែឆ្លុតគឺជាជំងឺដ៏កាចសាហាវមួយដែលបង្កោយដោយវីរុសឆ្កែឆ្លុត។

- ជាទូទៅ ជំងឺឆ្កែឆ្លុតឆ្លងរាលដាលក្នុងអំបូរសត្វផ្សេងៗ ហើយក៏អាចចំលងមកមនុស្សបានដែរ តាមរយៈសត្វដែលមានផ្ទុកមេរោគឆ្កែឆ្លុតខាំ។
- នៅក្នុងដំណាក់កាលដំបូងនៃការឆ្លង គេមិនឃើញមានស្តែងចេញនូវរោគសញ្ញាអ្វីឡើយ។ លុះច្រើនសប្តាហ៍ រឺច្រើនខែបន្ទាប់ពីសត្វដែលមានផ្ទុកមេរោគឆ្កែឆ្លុតខាំនោះ ទើបគេឃើញមានស្តែងចេញនូវរោគសញ្ញាឈឺចាប់ អស់កំលាំង ឈឺក្បាល គ្រុនក្តៅ និងមានអារម្មណ៍ញាំញី។ បន្ទាប់មក ជំងឺនេះស្តែងចេញជាពោតសញ្ញាធ្ងន់ធ្ងរដូចជា ការប្រកាច់ រង្វង់រង្វាន់ ខ្លាចទឹក ខ្លាចខ្យល់ និងភាពខ្លាំងកំរើកលែងបាន។ ជំងឺឆ្កែឆ្លុតនៅលើមនុស្សជានិច្ចកាលតែងតែបណ្តាលអោយស្លាប់បាត់បង់ជីវិត។
- ជាញឹកញាប់ សត្វឆ្កែជាប្រភពដែលចំលងជំងឺនេះមកមនុស្ស ក៏ប៉ុន្តែ អំបូរសត្វមួយចំនួនដូចជា ឆ្កា ស្វា ប្រដៀវ សំពោច ចចក កញ្ជ្រាង និង ថនិកសត្វផ្សេងទៀតក៏អាចចំលងជំងឺនេះមកមនុស្សបានដែរ។

២- តើអ្វីទៅជាក់ស្តែងបង្ការជំងឺឆ្កែឆ្លុត?

វ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺឆ្កែឆ្លុតត្រូវបានណែនាំអោយផ្តល់សម្រាប់អ្នកដែលមានហានិភ័យខ្ពស់ក្នុងការឆ្លងជំងឺនេះ និងជនរងគ្រោះដោយសត្វដែលសង្ស័យថាមានមេរោគឆ្កែឆ្លុតខាំ។

វ៉ាក់សាំងនេះត្រូវបានផលិតឡើងពីវីរុសឆ្កែឆ្លុតដែលត្រូវបានគេសំលាប់អោយងាប់ហើយ វាមិនអាចបង្កជំងឺឆ្កែឆ្លុតបានឡើយ។

៣- តើអ្នកណាខ្លះត្រូវទទួលវ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺឆ្កែឆ្លុតនេះ? ហើយត្រូវធ្វើនៅពេលណា?

ការផ្តល់វ៉ាក់សាំងបង្ការមុនមានសត្វខាំត្រូវបានណែនាំសំរាប់៖

- អ្នកដែលប្រឈមមុខខ្ពស់នឹងការឆ្លងមេរោគនេះដូចជា ពេទ្យសត្វ អ្នកថែទាំសត្វ និងអ្នកដើររុករៃ រឺបុគ្គលិកមន្ទីរពិសោធន៍ដែលប្រឈមនឹងមេរោគនេះ
- អ្នកដែលត្រូវធ្វើដំណើរទៅកាន់តំបន់ដែលកើតជំងឺនេះញឹកញាប់ ហើយអាចនឹងមានការប៉ះពាល់ជាមួយនឹងសត្វដែលផ្ទុកមេរោគនេះ

*** កាលវិភាគផ្តល់វ៉ាក់សាំងបង្ការមុនមានសត្វខាំគឺ៖ ថ្ងៃដំបូង - ៧ថ្ងៃក្រោយមក - ២៨ថ្ងៃក្រោយមក

ក្រុមមនុស្សដែលមានការប្រឈមនឹងជំងឺនេះត្រូវនៅបន្តទទួលជូសទី៤ (១ឆ្នាំបន្ទាប់ពីជូសទី១) និងការរំលឹករៀងរាល់៥ឆ្នាំម្តងត្រូវបានគេអនុវត្ត។

*** កាលវិភាគផ្តល់វ៉ាក់សាំងជំងឺឆ្កែឆ្លុតក្រោយសត្វខាំគឺ៖ ថ្ងៃដំបូង - ថ្ងៃទី៣ - ថ្ងៃទី៧ - ថ្ងៃទី១៤ - ថ្ងៃទី២៨

អ្នកដែលធ្លាប់ទទួលវ៉ាក់សាំងនេះពីមុនបានត្រឹមត្រូវរួចហើយនោះ ត្រូវទទួលវ៉ាក់សាំងបន្ថែម២ជូសទៀត ក្នុងករណីដែលមានសត្វខាំទៀតដោយ១ជូសត្រូវទទួលភ្លាមៗ រួច១ជូសបន្ទាប់ នៅ ៣ថ្ងៃក្រោយ។

៤- ពិភាក្សាជាមួយគ្រូពេទ្យ ប្រសិនបើ...

- អ្នកដែលធ្លាប់មានប្រវត្តិប្រតិកម្មធ្ងន់ធ្ងរជាមួយនឹងវ៉ាក់សាំងប្រភេទនេះពីមុន ឬធ្លាប់ប្រតិកម្មជាមួយសមាសធាតុផ្សេងទៀតដែលមាននៅក្នុងវ៉ាក់សាំងនេះ
- អ្នកដែលមានប្រព័ន្ធភាពស៊ាំចុះខ្សោយ

បើសិនជាអ្នកត្រូវបានសត្វខាំ អ្នកត្រូវតែទទួលវ៉ាក់សាំងបង្ការជាដាច់ខាត នោះបើអ្នកកំពុងមានជំងឺអ្វីក៏ដោយ។

៥- ផលវិបាកដែលអាចកើតមានក្រោយចាក់វ៉ាក់សាំង

ដូចឱសថផ្សេងៗទៀតដែរ វ៉ាក់សាំងអាចបណ្តាលអោយមានផលវិបាកធ្ងន់ធ្ងរ ដូចជាប្រតិកម្មអាលែកស៊ីជាដើម។ ប៉ុន្តែលទ្ធភាពដែលវ៉ាក់សាំងនេះអាចបណ្តាលអោយមានផលវិបាកធ្ងន់ធ្ងរមានតិចតួចបំផុត។ ផលវិបាកដែលអាចកើតឡើងរួមមាន៖

- ឈឺ ឬ ហើមត្រង់កន្លែងចាក់
- គ្រុនក្តៅ ឈឺក្បាល ឈឺសាច់ដុំ
- ឡើងកន្ទួលក្រហមលើស្បែក និងចង្កោរ
- ប្រតិកម្មធ្ងន់ធ្ងរ (កំរមានណាស់)

ប្រសិនបើមានសញ្ញាប្រតិកម្មធ្ងន់ធ្ងរ សូមទូរស័ព្ទដល់គ្រូពេទ្យជាបន្ទាន់!