

វ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺបង្កដោយមេរោគក្លីម៉ូកូក (PNEUMOCOCCAL VACCINE)

១- ហេតុអ្វីអ្នកត្រូវទទួលវ៉ាក់សាំងប្រភេទនេះ?

មេរោគក្លីម៉ូកូកជាប្រភេទបាក់តេរីមួយដែលអាចឆ្លងពីមនុស្សម្នាក់ទៅម្នាក់ តាមរយៈការចុះពាល់ រឺនៅស្ថិតស្ថាលនឹងអ្នកមានផ្ទុកមេរោគនេះ។ បាក់តេរីនេះអាចបណ្តាលអោយមានជំងឺរលាកត្រចៀក និងជំងឺធ្ងន់ធ្ងរផ្សេងទៀតដូចជា៖

- រលាកសួត
- រលាកស្រោមខួរ
- មេរោគជ្រៀតចូលក្នុងឈាមជាដើម។

ជំងឺរលាកស្រោមខួរដែលបង្កដោយមេរោគនេះ (Pneumococcal meningitis) អាចបណ្តាលអោយផ្លូវ និងខួរខួរក្បាល ប្រមាណជា ១០ ភាគរយនៃករណីជំងឺ។ ការព្យាបាលដោយថ្នាំ Penicillin និងថ្នាំផ្សេងៗទៀត លែងមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ដូចមុនទៀតហើយ ដោយសារតែមេរោគក្លីម៉ូកូកខ្លះបានស៊ាំនឹងព្យាបាលទាំងនោះហើយ។ ដូចនេះ ការចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺនេះពិតជាមានសារៈសំខាន់ណាស់។

២- វ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺបង្កដោយមេរោគក្លីម៉ូកូក

វ៉ាក់សាំង Synflorix អាចបង្ការការបង្ករោគដោយក្លីម៉ូកូក ចំនួន ១០ ក្រុម (មេរោគដែលអាចបង្ករោគលើមនុស្សនេះមានច្រើនក្រុម)។ វ៉ាក់សាំង Synflorix ត្រូវផ្តល់ដល់កុមារ តាមការណែនាំដូចខាងក្រោម៖

អាយុតិចជាង ៦ ខែ (ត្រូវផ្តល់ ៤ ដង)

- ដូសទី១: ពេលកុមារអាយុ ១ ខែកន្លះ ទៅ ៦ ខែ
- ដូសទី២: ១ ទៅ ២ ខែ បន្ទាប់ពីដូសទី ១
- ដូសទី៣: ១ ទៅ ២ ខែ បន្ទាប់ពីដូសទី ២
- ដូសទី៤: យ៉ាងតិច ៦ ខែ ពីដូសទី ៣

អាយុ ៧ ខែ ទៅ ១១ ខែ (ត្រូវផ្តល់ ៣ ដង)

- ដូសទី១: កុមារនៅ ចន្លោះអាយុ ៧ ទៅ ១១ ខែ
- ដូសទី២: ១ ទៅ ២ ខែ បន្ទាប់ពីដូសទី ១
- ដូសទី៣: យ៉ាងតិច ២ ខែ ក្រោយដូសទី ២

អាយុ ១២ ខែ ទៅ ២៣ ខែ (ត្រូវផ្តល់ ២ ដង)

- ដូសទី១: កុមារនៅចន្លោះអាយុ ១២ ទៅ ២៣ ខែ
- ដូសទី២: ២ ខែ បន្ទាប់ពីដូសទី ១

៣- តើកុមារណាខ្លះ ដែលមិនគួរទទួលវ៉ាក់សាំងនេះ?

- កុមារដែលធ្លាប់មានប្រវត្តិប្រតិកម្មធ្ងន់ធ្ងរ ជាមួយវ៉ាក់សាំងប្រភេទនេះពីមុន ឬ ធ្លាប់ប្រតិកម្មធ្ងន់ធ្ងរជាមួយសមាសធាតុផ្សំផ្សេងទៀតមានក្នុងវ៉ាក់សាំងនេះ
- សម្រាប់កុមារដែលកំពុងមានជំងឺ ការផ្តល់វ៉ាក់សាំងគួរត្រូវពន្យារពេលរហូតដល់កុមារជាសះស្បើយសិន

៤- ផលវិបាកដែលអាចកើតមានក្រោយពេលចាក់វ៉ាក់សាំងនេះ

ក៏ដូចជាឱសថផ្សេងទៀតដែរ វ៉ាក់សាំងអាចបណ្តាលអោយមានផលវិបាកធ្ងន់ធ្ងរដូចជា ប្រតិកម្ម អាណែមីយ៉ាជាដើម។ ប៉ុន្តែលទ្ធភាពដែលវ៉ាក់សាំងនេះអាចបណ្តាលអោយមានផលវិបាកធ្ងន់ធ្ងរមានតិចតួចបំផុត។ ផលវិបាកដែលអាចកើតឡើងរួមមាន៖

- ឈឺ ឬ ហើមត្រង់កន្លែងចាក់
- គ្រុនក្តៅ ឈឺក្បាល
- ឡើងកន្ទួលក្រហមលើស្បែក
- ក្មេងយំច្រើន ញ្ញាំញ្ញី
- ប្រតិកម្មធ្ងន់ធ្ងរ (កម្រមានណាស់)

កុមារតូចៗដែលចាក់វ៉ាក់សាំងនេះ ក្នុងពេលតែមួយជាមួយវ៉ាក់សាំងផ្តាសាយ អាចមានអាការៈក្តៅខ្លួនខ្លាំង។

ប្រសិនបើមានសញ្ញាប្រតិកម្មធ្ងន់ធ្ងរ សូមទូរស័ព្ទដល់មន្ត្រីពេទ្យជាបន្ទាន់!